



---

## Bulletin mensuel

Institut de physique du globe de Paris  
Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise

ISSN 2610 – 5101

Mai 2023

---

**PITON DE LA FOURNAISE** (VNUM #233020)

**Latitude** : 21.244°S

**Longitude** : 55.708°E

**Altitude sommet** : 2632 m

*Le Piton de la Fournaise est un volcan basaltique de point chaud situé au sud-est de l'île de la Réunion (océan Indien).*

*Volcan actif, son histoire éruptive a débuté il y a environ 500 000 ans. Il produit des laves fluides à l'origine d'éruptions majoritairement effusives (avec émissions de fontaines de lave et de coulées de lave) dont la fréquence est en moyenne de deux par an depuis 1998. Plus rarement, des éruptions explosives (avec émissions de blocs recouvrant la zone sommitale et émissions de cendres pouvant se disperser sur de grandes distances) ont eu lieu par le passé avec une récurrence centennale.*

*La majorité des éruptions récentes sont limitées à la caldera de l'Enclos Fouqué, à l'exception de quelques éruptions « hors Enclos » qui ne représentent que 3% des éruptions totales sur les 300 dernières années (1977, 1986, 1998 pour les plus récentes). Ce type d'éruptions « hors Enclos » peut potentiellement représenter une menace pour la population.*

*Depuis fin 1979, l'activité du Piton de la Fournaise est surveillée et suivie par l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), une station de l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP).*

**Niveau d'alerte : Vigilance**  
(depuis le 24 avril 2023 – en cours)

(Voir tableau en annexe)



## A. Activité du Piton de la Fournaise

### Sismicité

Au mois de mai 2023, l'OVPF-IPGP a enregistré au niveau du massif du Piton de la Fournaise au total :

- 212 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2,5 km au-dessus du niveau de la mer) sous les cratères sommitaux ;
- 13 séismes profonds (sous le niveau de la mer) ;
- 60 séismes de type longue-période ;
- 380 éboulements.




Figure 1 : Histogramme représentant le nombre de séismes volcano-tectoniques superficiels (en haut) et d'éboulements (en bas) par jour enregistrés en mai 2023 (© OVPF-IPGP).

Le mois de mai 2023 aura été marqué par une diminution continue de la sismicité sous le sommet, passant d'une dizaine de séismes volcano-tectoniques superficiels par jour la première quinzaine à environ 5 par jour la deuxième quinzaine du mois (Figure 1).

Ces séismes étaient localisés sous la bordure est du cratère Dolomieu entre 300 et 800m au-dessus du niveau de la mer (Figure 2).

Une sismicité profonde a également été enregistrée tout au long du mois de mai, notamment sous le flanc ouest du cône terminal (Figure 2).

De nombreux éboulements dans le Cratère Dolomieu, au Cassé de la Rivière de l'Est et au niveau de la coulée de l'éruption de septembre-octobre 2022 ont aussi été enregistrés.





Figure 2 : Sismicité sous le Piton de la Fournaise au mois de mai 2023. Carte de localisation (épices) et coupes nord-sud et est-ouest (montrant la localisation en profondeur, hypocentres) des séismes enregistrés et localisés manuellement par l'OVVF-IPGP. Seuls les séismes localisables sont représentés sur la carte (© OVVF-IPGP).




## Déformation

L'inflation sommitale qui était enregistrée depuis mars 2023 s'est arrêtée début mai (Figures 3 et 4). Depuis aucun signal significatif n'a été enregistré au sommet, alors qu'une faible et lente inflation est toujours enregistrée en champ lointain (base du cône terminal et hors Enclos ; Figures 3 et 4). La lente inflation en champ lointain pourrait témoigner de la mise en pression d'une source magmatique profonde (sous le niveau de la mer) et/ou de circulations de fluide en profondeur.



PROC.GIPSYX / BASELINES - sysop@pitondecalsumets - 01-Jun-2023 11:15:48 +0 - gns.m (2022-06-12) / WebObs MMXXIII

Figure 3 : Illustration de la déformation sur les six derniers mois (les éventuelles périodes éruptives et intrusives sont respectivement représentées par un fond rouge et vert). Sont ici représentées les variations de distance entre deux récepteurs GPS traversant l'édifice du Piton de la Fournaise, au sommet (référence SNEG ; en haut), à la base du cône terminal (référence FOAG ; au milieu) et en champ lointain (référence PRAG ; en bas) (cf. localisation sur la Figure 5). Une hausse est synonyme d'élongation et donc de gonflement du volcan ; inversement une diminution indique une contraction et donc un dégonflement du volcan (© OVPF-IPGP).



PROC.GIPSYX / BASELINES\_ - sysop@pitondescalumets - 01-Jun-2023 11:25:20 +0 - gnss.m (2022-06-12) / WebObs MMXXIII

Figure 4 : Illustration de la déformation en mai 2023 (les éventuelles périodes éruptives et intrusives sont respectivement représentées par un fond rouge et vert). Sont ici représentées les variations de distance entre deux récepteurs GPS traversant l'édifice du Piton de la Fournaise, au sommet (référence SNEG ; en haut), à la base du cône terminal (référence FOAG ; au milieu) et en champ lointain (référence PRAG ; en bas) (cf. localisation sur la Figure 5). Une hausse est synonyme d'élongation et donc de gonflement du volcan ; inversement une diminution indique une contraction et donc un dégonflement du volcan (© OVPF-IPGP).




Figure 5 : Localisation des lignes de base représentées sur les figures 3 et 4 (© OVPF-IPGP).

\* Glossaire : Les signaux GPS sommitaux sont le témoin de l'influence de sources de pression superficielles à l'aplomb du volcan alors que les signaux GPS lointains sont le témoin de l'influence de sources de pression profondes à l'aplomb du volcan. Une inflation est souvent synonyme d'une mise en pression ; à l'inverse une déflation est souvent synonyme d'une dépressurisation.



## Géochimie des gaz

### Concentration en CO<sub>2</sub> dans le sol

Sur le site proximal du Gîte, une chute brutale des flux avec des valeurs très faibles de CO<sub>2</sub> a été détectée après le 3 janvier 2022. A la fin de l'éruption du 22 décembre – 17 janvier 2022 une nouvelle phase d'augmentation a été enregistrée, mais avec un taux plus faible. Les fortes fluctuations observées au cours du mois de février 2022 sont certainement liées à des influences environnementales dues à deux évènements cycloniques (Figure 6).




Figure 6 : Comparaison entre les moyennes normalisées des données de flux de CO<sub>2</sub> dans le sol, brutes (modèle OVPF ; moyennées sur une fenêtre glissante de 15 jours, en vert) et corrigées de l'influence à long terme des paramètres environnementaux (modèle INGV MALFIT ; en noir), enregistrées sur les stations localisées en champ lointain depuis octobre 2016 (date d'installation de la dernière station). Les périodes éruptives sont représentées en rouge et les périodes intrusives en gris (© OVPF-IPGP).

Une nouvelle augmentation a été enregistrée à la fois en champ distal et proche à la fin février 2022 avec une forte accélération à la mi-mars 2022 (Figure 6). Cette phase d'augmentation a duré jusqu'au 5 mai en champ distal et jusqu'au 19 mai 2022 en champ proche.

Depuis mi-mai, une tendance à la diminution des flux de CO<sub>2</sub> est enregistrée en champ distal et en champ proximal. L'éruption du 19 septembre – 5 octobre 2022 a débuté après une diminution significative des flux de CO<sub>2</sub>, suggérant certainement le transfert progressif de magma vers des niveaux crustaux peu profonds. Depuis la fin de l'éruption du 19 septembre – 5 octobre 2022, les flux de CO<sub>2</sub> sont restés à un niveau stable.

Il est intéressant de noter que l'analyse isotopique des gaz échantillonnés sur les sites distaux (PNRN, BLEN, PCNR) et proximaux (P0 ; GITN) montre une augmentation marquée de la contribution magmatique au cours de la période mars-avril 2022 (Figure 7). La contribution magmatique a ensuite diminué dans la seconde moitié de 2022.




Figure 7 : Variations des isotopes du carbone ( $\delta^{13}C$ ) dans le  $CO_2$  des gaz du sol émis par le point de contrôle dont le flux est le plus élevé dans la zone proximale (point de contrôle : GIT0).

Une nouvelle tendance d'augmentation fluctuante des émissions de  $CO_2$  du sol a commencé depuis le début de décembre 2022 au niveau des sites distaux et proximaux. L'augmentation s'est produite à un rythme élevé jusqu'à la mi-mars 2023, puis s'est ensuite ralentie.

\* Glossaire : Le  $CO_2$  étant le premier gaz à être libéré du magma à grande profondeur (depuis le manteau), sa détection en champ lointain peut être synonyme d'une remontée profonde de magma. Son évolution en champ proche peut être liée au transfert magmatique dans le système d'alimentation plus superficiel (environ <2-4 km sous la surface).

#### Composition des fumerolles sommitales par méthode MultiGas

- Teneur en  $SO_2$  : en dessous du seuil de détection.




Figure 8 : Concentrations brutes (en bleu) de  $\text{SO}_2$  dans l'atmosphère au sommet du Piton de la Fournaise (station MultiGaS)  
Barres rouges : éruptions ; Barres grises : intrusions (© OVPF-IPGP)

\* Glossaire : La méthode MultiGaS permet de mesurer les concentrations en  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{SO}_2$  et  $\text{CO}_2$  dans l'atmosphère au sommet du Piton de la Fournaise. Le transfert magmatique dans le système d'alimentation du Piton de la Fournaise peut se traduire en une augmentation des concentrations en  $\text{SO}_2$  et du rapport C/S (carbone/soufre).

#### Flux de $\text{SO}_2$ dans l'air dans l'Enclos Fouqué par méthode DOAS

Les flux de  $\text{SO}_2$  dans l'air sont faibles, proches ou en-dessous du seuil de détection.

\* Glossaire : Lors des phases de repos du volcan, le flux de  $\text{SO}_2$  au Piton de la Fournaise est en-dessous du seuil de détection ; le flux de  $\text{SO}_2$  peut augmenter lors du transfert magmatique dans le système d'alimentation plus superficiel ; pendant les éruptions, il est directement proportionnel à la quantité de lave émise à la surface.

## Phénoménologie

Aucune activité éruptive au cours du mois de mai 2023.



## Bilan

En mai 2023, la réalimentation en magma et la pressurisation du réservoir superficiel semble avoir ralenti ou cessé.

A noter que depuis 2016, les réalimentations du réservoir magmatique superficiel sous le Piton de la Fournaise se font par impulsions, ainsi de telles phases d'accalmie dans les déformations et la sismicité ont déjà été observées à plusieurs reprises entre 2016 et 2023 sur des périodes allant de 15 à 80 jours environ.



## B. Activité sismique locale et régionale

### Sismicité locale et régionale

Au mois de mai 2023, l'OVPF-IPGP a enregistré au niveau local et régional :

- 48 séismes locaux (dans un rayon de 200 km de l'île, majoritairement sous l'île, Figures 9 et 10) ;
- 7 séismes régionaux (dans la zone océan Indien).

Au mois de mai 2023, l'OVPF-IPGP a enregistré 48 séismes locaux disséminés sous l'Île de La Réunion, principalement au niveau du Cirque de Salazie (Figure 10).

Ces séismes sont localisés entre 10 km et 20 km de profondeur dans la lithosphère océanique sur laquelle s'est formé l'édifice volcanique à l'origine de La Réunion.




Figure 9 : Histogramme représentant le nombre de séismes locaux (Ile de La Réunion) par jour enregistrés en mai 2023 (© OVPF-IPGP).




Figure 10 : Sismicité sous La Réunion au mois de mai 2023. Carte de localisation (épencentres) et coupes nord-ouest - sud-est et sud-ouest – nord-est (montrant la localisation en profondeur, hypocentres) des séismes enregistrés et localisés par l'OVPF-IPGP. Seuls les séismes localisables ont été représentés sur la carte (© OVPF-IPGP).



## Activité sismo-volcanique à Mayotte

Le REseau de surveillance VOlcanologique et Sismologique de MAyotte (REVOSIMA) est la structure en charge de la surveillance de l'activité volcanique et sismique de la région de Mayotte. L'IPGP opère ce réseau à travers l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise avec l'appui du BRGM et sa direction régionale à Mayotte. Le REVOSIMA est soutenu par un étroit partenariat scientifique et technique. Le consortium du REVOSIMA : IPGP et Université Paris Cité, BRGM, IFREMER, CNRS, BCSF-RéNaSS, ITES et Université de Strasbourg, IGN, ENS, SHOM, TAAF, Météo France, CNES, Université Grenoble Alpes et ISTerre, Université Clermont Auvergne, LMV et OPGC, Université de La Réunion, Université Paul Sabatier, Toulouse et GET-OMP, Université de la Rochelle, Université de Bretagne Occidentale, IRD et collaborateurs.

Toutes les informations concernant le REVOSIMA et l'activité à Mayotte sont à retrouver sur ces liens :

- <http://www.ipgp.fr/fr/reseau-de-surveillance-volcanologique-sismologique-de-mayotte>
- <http://www.ipgp.fr/fr/actualites-reseau>
- <https://www.facebook.com/ReseauVolcanoSismoMayotte/>

La direction de l'OVPF-IPGP, le 2 juin 2023



## C. Annexes

### Définition des niveaux d'Alerte volcanique pour le Piton de la Fournaise

(Extrait disposition spécifique « Volcan Piton de la Fournaise » - arrêté n°2242)

PREFECTURE DE LA RÉUNION	DISPOSITION SPÉCIFIQUE VOLCAN	EMZPCOI
--------------------------	-------------------------------	---------

#### 3.2. Les différents niveaux d'alerte

Phase d'alerte et définition	Objectif	Actions
<p><b>Vigilance : activité persistante et continue sous le massif</b></p> <p>Situation d'activité « hors norme » sous le massif du Piton de la Fournaise à l'intérieur ou éventuellement hors de l'enclos (séismes, gonflements, etc...). <u>Éruption possible à moyen terme</u> (quelques jours à plusieurs semaines) et/ou présence de risques sur le secteur (éboulements, stabilisation d'un effondrement de caldeira, augmentation des émissions gazeuses, présence de coulées de lave en cours de refroidissement, etc...)</p>	<p>Mettre en garde les services qui seraient amenés à intervenir en cas d'éruption</p> <p>Protéger les populations présentes sur le site</p>	<p>- Pour le public <b>non-accompagné</b> : accès à la partie haute de l'enclos possible sur les seuls sentiers balisés ouverts</p> <p>- Pour le public <b>accompagné d'un professionnel</b> : accès à la partie haute de l'enclos possible hors des sentiers balisés à l'exception des zones d'exclusion (voir § 3.2.1)</p>
<p><b>Alerte 1 : éruption probable ou imminente</b></p> <p>Détection des signes d'une activité croissante (les séismes ou déformations ou émissions gazeuses sont d'intensité « hors norme » et croissante) qui pourrait se traduire par la formation d'une fissure éruptive (sortie de lave) dans les heures ou les jours qui suivent. L'éruption n'est plus « possible » (comme en phase de vigilance) mais devient probable, voire imminente lorsque la formation d'une fissure éruptive est certaine, voire en cours.</p>	<p>Évacuer les populations présentes sur le site</p>	<p>Fermeture de l'enclos et évacuation des randonneurs qui se trouveraient sur le site</p>
<p><b>Alerte 2 : éruption en cours,</b> qui peut être de trois types :</p> <p><i>Alerte 2-1 : L'éruption est située dans l'enclos (y compris dans le cratère Dolomieu) et ne présente pas de menace particulière pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement</i></p> <p><i>Alerte 2-2 : L'éruption est située dans l'enclos et présente une menace directe ou indirecte pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement (risque de coupure de la RN2, pluies acides, feux de forêt...)</i></p>	<p>Garantir la protection des populations, des biens et de l'environnement à proximité ou à l'extérieur du site</p>	<p>Alerte 2.1 : aucune action dans l'immédiat (car accès à l'enclos déjà interdit et enclos déjà évacué).</p> <p>Alerte 2.2 : en cas de nécessité, activation des COP / PCO + fermeture de la RN2 + évacuation des personnes et véhicules concernés (en fonction des enjeux)</p>
<p><i>Alerte 2-3 : L'éruption est située hors de l'enclos et présente une réelle menace pour la sécurité des personnes, des biens ou de l'environnement (impact possible sur les zones habitées).</i></p>	<p>Garantir la protection des populations, des biens et de l'environnement à proximité ou à l'extérieur du site</p>	<p>Alerte 2.3 : activation des COP / PCO + évacuation des personnes menacées (notamment dans les zones habitées)</p>
<p><b>Sauvegarde</b></p> <p>L'éruption est terminée, une réouverture partielle de l'enclos est possible</p> <p>Un arrêté pour passage en phase de sauvegarde aménagé peut être pris préalablement aux reconnaissances terrain pour permettre la réouverture de la partie basse de l'enclos uniquement, si les conditions le permettent.</p>	<p>Permettre la réouverture partielle de l'enclos en toute sécurité</p>	<p>- mise en œuvre des reconnaissances préalables</p> <p>- définition des modalités de réouverture de l'enclos au public</p>

Arrêté préfectoral n° 2242 du 08/11/2021      Validé par Jacques BILLANT, Préfet de La Réunion      22 / 57



## Rapport synthétique sur les derniers produits éruptifs

Pour caractériser l'éruption du 19 septembre – 5 octobre 2022, 8 échantillons ont été collectés parmi lesquels deux sont des pyroclastes (lapilli, scorie) et les 6 autres sont des laves qui ont été soit collectées à l'état fondu et vitrifiées sur site (syn-éruptif), soit collectées à l'état refroidi (post-emplacemement).



Figure 11 : Fragments d'échantillons collectés par l'OVVF lors de l'éruption du 19 septembre – 5 octobre 2022 au Piton de la Fournaise

Les fragments pyroclastiques montrent une vésicularité de 37vol% à 76vol%, avec jusqu'à 33vol % de vésicules isolées. Les scories de type « golden pumice » sont les fragments les plus vésiculés (68- 80 vol%) avec des valeurs non négligeables de vésicules isolées (jusqu'à 26vol%). Les échantillons de lave ont une vésicularité plus faible (28-60vol%) que les pyroclastes. Comme observé précédemment, les laves trempées sur site ont une vésicularité plus faible que les laves collectées post-emplacemement et quelques vésicules isolées (17vol%). **Les données de cette éruption confirment l'augmentation de la densité des produits éruptifs mesurée depuis 2019 et la tendance globale à l'augmentation de la densité depuis le début du cycle éruptif en 2014.**

Tous les échantillons sont presque aphyriques en termes de phénocristaux (<5vol% de phénocristaux), la teneur en microphénocristaux varie de 13vol% dans les pyroclastes à 21- 29vol.% dans les laves.

La composition des verres et des microlites sont similaires à celles des laves émises lors des précédentes éruptions depuis 2020 et indiquent une température pré-éruptive qui varie entre 1140°C au début de l'éruption à 1153°C vers la fin de l'éruption. **Ces températures relativement faibles sont cohérentes avec celles d'un système magmatique peu profond.**

Sur le suivi géochimique à long terme, les laves émises jusqu'à l'éruption du 22 décembre 2021 – 17 janvier 2022 ont une signature intermédiaire en CaO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> - indice du degré d'évolution de magma - qui diminue lors de l'éruption du 19 septembre – 5 octobre 2022. **Cette tendance pourrait marquer un refroidissement progressif de la partie peu profonde du système magmatique.**

Comme souvent observé lors d'éruptions de longue durée, les laves émises en fin d'éruption (échantillons du 05/10/2022) sont légèrement plus mafiques (plus de MgO, rapport CaO/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> plus élevé, contenu en Ni et Cr plus élevé) et ont des rapports d'éléments incompatibles légèrement plus élevés que celles émises en début d'éruption. Cette évolution temporelle témoigne d'hétérogénéités existant dans le système de plomberie magmatique. **Ces variations sont corrélées à une légère augmentation de la concentration en MgO des verres, ce qui indique un magma légèrement plus chaud émis vers la fin de l'éruption.**

Les produits de l'éruption de septembre-octobre 2022 ont une signature « appauvrie » (faible rapport La/Yb), qui a été attribuée à la fusion d'une source mantellique plus réfractaire. **La diminution de la signature des éléments traces incompatibles amorcée en août 2019 est corrélée à une diminution de 23% du taux moyen de production de lave par rapport à la période 2014-2019.**



### Remerciements

Merci aux organismes, collectivités et associations d'afficher publiquement ce bulletin pour une diffusion la plus large possible.

### Informations

Retrouvez l'ensemble des informations relatives à l'activité du Piton de la Fournaise sur les différents médias de l'OVPF-IPGP :

- le site internet : [ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf](http://ipgp.fr/fr/ovpf/actualites-ovpf)
- le compte Twitter : [twitter.com/obsfournaise](https://twitter.com/obsfournaise)
- le compte Facebook : [facebook.com/ObsVolcanoPitonFournaise](https://facebook.com/ObsVolcanoPitonFournaise)

Un bulletin automatique préliminaire d'activité de l'OVPF-IPGP, relatif aux activités de la veille, validé par un.e analyste, est publié quotidiennement. Il est accessible directement sur ce lien :

[http://volcano.ipgp.fr/reunion/Bulletin\\_quotidien/bulletin.html](http://volcano.ipgp.fr/reunion/Bulletin_quotidien/bulletin.html)

La sismicité déterminée et validée en continu par l'OVPF-IPGP peut être également suivie sur le portail RENASS :

<https://renass.unistra.fr/fr/zones/la-reunion>

***Les informations de ce document ne peuvent être utilisées sans y faire explicitement référence.***